## 104. **Solanum luteum** Miller (Solanaceae)

Specie nuova per la Valle d'Aosta.

REPERTO I. Arnad, bordo del tratto iniziale della mulattiera che sale da Arnad le Vieux ad Anviey, altitudine 400 m circa, 8 novembre 1992, *M. Bovio et G. V. Cerutti* (in erb. BOVIO).

REPERTO II. Torille (Verrès), scarpate della costruenda strada a monte del villaggio, 395 m, 13 dicembre 1992, *G. V. Cerutti* (in erb. CERUTTI).

OSSERVAZIONI. Specie eurimediterranea chiaramente legata agli ambienti fortemente disturbati dall'uomo comparendo in incolti, macerie, colture, come avviene anche nel caso delle stazioni qui segnalate.

Entrambi i reperti, pur presentando bacche aranciate e non decisamente rosse, come attribuito dalle flore consultate alla subsp. *alatum* (Moench) Dostàl, presentano però la caratteristica pelosità sparsa, applicata e non ghiandolosa, tipica di quest'ultima entità.

L'esame degli erbari di TO e FI e della letteratura floristica valdostana fondamentale, non ha portato all'individuazione di precedenti stazioni segnalate per la regione.

## 105. **Bidens frondosa** L. (Compositae)

Nuova stazione per la Valle d'Aosta.

REPERTO. Bassa valle di Champorcher, lungo la strada tra Hône e Pourcil (destra orografica della valle), altitudine 550 m, 18 ottobre 1992, *M. Bovio et G. V. Cerutti* (in erb. BOVIO).

OSSERVAZIONI. Segnalata più avanti, in questa stessa rubrica, anche da DESFAYES (segn. n. 116), si faccia riferimento a questa per le notizie generali sulla specie e le altre stazioni valdostane.

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 106.

G. V. CERUTTI, Via Bonino 34, Pralungo (VC)

## 106. **Crocus napolitanus** Mord. et Loisel. (Iridaceae)

Specie nuova per la Valle d'Aosta.

REPERTO I. Valle di Champorcher, vallone delle Brenve, dorsale prativa dell'Alpe Valsemma-desot, altitudine 1650-1800 m, 10 maggio 1992, *G. V. Cerutti* (in erb. MUSEO REG. SC. NAT., ST-PIERRE; in erb. CERUTTI).

REPERTO II. Valle di Champorcher, appena sotto la vetta del Mont Digny, versante est, altitudine 2135 m, 17 maggio 1992, *G. V. Cerutti* (in erb. MUSEO REG. SC. NAT., ST-PIERRE, in erb. CERUTTI).

OSSERVAZIONI. Specie eurimediterranea, di cui alcuni autori negano l'autonomia da *Crocus albiflorus* Kit. Secondo PIGNATTI (*Fl. d'Ital.*, 3:420, 1982) sulle Alpi la presenza della specie sarebbe limitata al solo bordo meridionale.

La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 71) da BOVIO (*Rev. Valdôt. Hist. Natur.*, 39, 1990), che ne segnalava la presenza nel settore piemontese del basso bacino della Dora Baltea. In questa sede ne viene invece indicata la presenza anche nella Valle d'Aosta in senso stretto. Negli erbari di TO e FI, per la Valle d'Aosta vi sono solo campioni ascrivibili a *Crocus albiflorus* Kit (DAL VESCO, *in verbis*).

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 107-110.

M. BOVIO, Museo Regionale di Scienze Naturali, St-Pierre

## 107. **Cystopteris dickieana** R. Sim (Athyriaceae)

Stazione riconfermata.

REPERTO. Valle di Cogne, terrazzo a ovest di Taverona, altitudine 2390 m, 11 agosto 1991, *M. Bovio et E. Martini* (in erb. BOVIO).