

302. *Carex pilulifera* L. (Cyperaceae)

Nuove stazioni per la Valle d'Aosta.

REPERTO I. Riserva naturale del Marais di Morgex; prateria al limite occidentale dell'isolotto vicino alla riva sinistra, altitudine 895 m, 18 giugno 2003, *M. Bovio* (AO: N.SFV-1752).

REPERTO II. Valle di Gressoney. Riserva naturale del Mont Mars, tra il lago di Bonnel e il Lei Long d'en bas, uscendo sui ripiani a ovest del secondo, 1900 m, 13 agosto 2004, *M. Bovio*, *N. Gerard et L. Poggio* (in erb. Bovio, n. 2519).

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 186) da Bovio e Prosser (*Rev. Valdôtaine Hist. Nat.*, 52: 161, 1998), a cui si rimanda per le notizie generali e la situazione in Valle d'Aosta.

Le due nuove stazioni, site agli opposti estremi della Valle d'Aosta (quella già segnalata si trova in Val d'Ayas), indicano una presenza probabilmente estesa a tutta la regione, sebbene la specie appaia rara.

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 303.

M. Lonati, Via Garibaldi 18, Quarona (VC)

303. *Allium victorialis* L. (Liliaceae)

Nuova stazione per la Valle d'Aosta.

REPERTO. Valgrisenche. Versante a E dell'Alpe Mont-Fortchat a monte della strada sterrata, altitudine 2220 m, 20 giugno 2006, *M. Lonati* (AO: N.SFV-2139).

OSSERVAZIONI. La specie è già stata descritta nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 273) da Bovio (*Rev. Valdôtaine Hist. Nat.*, 59: 119, 2005), a cui si rimanda per le notizie generali e la situazione in Valle d'Aosta.

La specie è stata osservata in un'area molto circoscritta, in un unico nucleo denso e compatto costituito da 350-380 esemplari, all'interno di un arbusteto a dominanza di *Arctostaphylos uva-ursi* e *Juniperus nana* (*Junipero-Arctostaphyletum*). Un successivo sopralluogo effettuato in data 8 luglio 2006 ha permesso di verificare la presenza di soli tre esemplari fioriti. Data la considerevole estensione di tali cenosi arbustive nell'area in oggetto, non sono da escludere ulteriori presenze della specie.

La stazione descritta in questa sede è la sesta per la Valle d'Aosta e risulta la più meridionale del territorio regionale.

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 304.

A. Foieri, Parco naturale del Mont Avic, Loc. Fabbrica, Champdepraz (AO)

304. *Stemmacantha rhapontica* subsp. *imarckii* Dittr. (Asteraceae)

Nuova stazione per la Valle d'Aosta e specie rara nuova per il Parco naturale del Mont Avic.

REPERTO. Val Chalamy. Parco Naturale Mont Avic, lungo il sentiero del Lac Gelé, altitudine 2275 m, 14 luglio 2006, *A. Foieri*, det. *M. Bovio* (AO: N.SFV-2140).

OSSERVAZIONI. Entità W-Alpica (*S. rhapontica* s.l. è specie endemica delle Alpi), in Italia nota solo per Piemonte e Valle d'Aosta, dove è molto rara. Piuttosto nitrofila, popola cespuglietti, megaforbieti, pascoli, nel piano subalpino, raramente più in alto.

In Valle d'Aosta, la principale fonte bibliografica sulla distribuzione di questa specie rimane ancora il Catalogo di Vaccari (*Cat. rais. pl. vasc. V. Aoste*, 540, 1904-11), cui vanno aggiunti alcuni dati moderni. In totale, oltre a quella segnalata in questa sede, nella regione è noto un numero ridottissimo di stazioni: Valle di Champorcher nel vallone delle Brenve alle Barme (Bovio e Rosset, oss.); Valsavarenche tra il Pont du Grand-Clapey e le Meyes-Désot (Bovio, oss.); Valgrisenche presso l'imbocco del vallone del lago di San Grato (Bovio e Martello, oss., e numerosi altri osservatori) e segnalata anticamente a Planaval in direzione della Montagne du Glacier (Echarlod in herb. Bérard, campione controllato e confermato da Vaccari) e indicata da Gorret e Bich (*Guide de la V. Aoste*, 50, 1877) alla Montagne de Glarey (forse corrispondente al dato precedente di Echarlod ?); Valle della Thuile all'ingresso del vallone di Youla (Bovio e Rosset); Gran San Bernardo (AO: erb. storico Soc. Flore Vald. !), presso Pra d'Arc (Favre; Besse; Ferina, ecc.; Peyronel, Dal Vesco e Poletti - TO !); Valtournenche (Hirzel-Schinz - G) tra Liortère e Promoron, presso lo sperone roccioso SE del Mont Pancherot (Bovio e Broglio).