

OSSERVAZIONI. La specie è già stata oggetto di segnalazione nell'ambito della riconferma di una stazione storica nella Valle del Gran San Bernardo, nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 340) da Bovio, Broglio e Trompetto (*Rev. Valdôtaine Hist. Nat.*, 64: 79, 2010) a cui si rimanda per le notizie generali e la situazione in Valle d'Aosta.

La stazione qui indicata documenta questa presenza anche in Val d'Ayas, valle non citata nelle indicazioni storiche e nemmeno nei dati bibliografici moderni di una specie di cui si hanno comunque pochissimi dati in generale per la Valle d'Aosta.

SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 364 - 366.

C. GANZ, Fraz. Perrière 78, 11027 Saint-Vincent (AO)

### 364. *Cucubalus baccifer* L. (Caryophyllaceae)

Specie nuova per la Valle d'Aosta.

REPERTO. Arnad, boschetto presso il campo sportivo, altitudine 385 m, 26 agosto 2012, C. Ganz (AO-N.SFV-2824).

OSSERVAZIONI. Specie Eurosiberiana, in Italia diffusa soprattutto al nord e al centro ma piuttosto rara. Sulle Alpi risulta più frequente sul versante meridionale e nel settore occidentale (Aeschmann *et al.*, *Flora Alpina*, 1: 344, 2004). Popola boscaglie, cespuglieti, margine dei boschi nei piani inferiori della vegetazione.

Presso gli erbari di AO, TO-HP e FI (Bovio, com. verb.) non risultano reperti di questa specie relativi alla Valle d'Aosta, così come non sono state trovate segnalazioni nella bibliografia floristica valdostana fondamentale. Vi è solo un dato inedito di Poggio & Gerard (Bovio, com. verb.) che nel 2002 l'avrebbero osservata sempre presso Arnad, verso Machaby, in loc. Moulin de Va, 580 m; in tale occasione non erano stati però raccolti reperti e un sopralluogo successivo (Poggio e Bovio) non aveva portato alla riconferma della pianta.

### 365. *Erophila verna* (L.) DC. subsp. *praecox* (Steven) Walters (Brassicaceae)

Conferma della presenza in Valle d'Aosta.

REPERTO. Saint-Vincent, in Piazza Zerbion, sul selciato, altitudine 570 m, 5 marzo 2012, C. Ganz (AO-N.SFV-2823).

OSSERVAZIONI. Questa entità era già stata trattata nelle Segnalazioni floristiche valdostane (n. 348) da Bovio (*Rev. Valdôtaine Hist. Nat.*, 65: 181, 2011) dove veniva descritto lo stato delle conoscenze sulle varie sottospecie di *Erophila verna* in Valle d'Aosta. In tale sede era stato indicato che al momento non vi erano prove concrete sulla presenza della subsp. *praecox* (Steven) Walters nella regione, pur essendo stata indicata varie volte in bibliografia; infatti i controlli svolti in erbario avevano portato ad assegnare ad altra entità sottospecifica i campioni che avevano potuto essere reperiti. Il ritrovamento della stazione di Saint-Vincent conferma invece anche la presenza di questa sottospecie nella regione.

### 366. *Carduus pycnocephalus* L. subsp. *pycnocephalus* (Asteraceae)

Specie nuova per la Valle d'Aosta (probabile avventizia casuale).

REPERTO. Collina di Saint-Vincent. Nel villaggio di Perrière, pressi della vecchia Scuola elementare, bordi delle vie e presso i letamai, altitudine 1030-1035 m, 16 giugno 2011, C. Ganz, M. Bovio, M. Broglio *et F. Prinetti* (AO-N.SFV-2651; FI).

OSSERVAZIONI. Specie Mediterraneo-Turanica, in Italia comune in Penisola e Isole, meno frequente al nord e finora segnalata in tutte le regione ad eccezione della Valle d'Aosta (cfr. *Conti et al.*

- *Checklist Ital. Vasc. Flora*, 69: 2005. Seguendo la distribuzione indicata da Aeschmann *et al.* (*Flora Alpina*, 2: 580, 2004) sulle Alpi è presente solo sul versante meridionale, soprattutto nei settori insubrico e sud-occidentale. Popola soprattutto gli ambienti ruderali nei piani inferiori della vegetazione.

Presso gli erbari di TO-HP (Pistarino *et al.*, 1999) e FI (Bovio, lug. 2012) non sono stati riscontrati reperti relativi alla Valle d'Aosta, così come non sono state trovate segnalazioni nella bibliografia floristica valdostana fondamentale. Nella stazione qui indicata la pianta è stata osservata da circa 4-5 anni ed appare in espansione; è probabile che si tratti solo di specie avventizia, introdotta accidentalmente nella regione di recente. In seguito la pianta è stata osservata anche più in basso, a Monjovet, lungo la stradina di accesso al villaggio di Balmas, a 450 m circa (Ganz, 1.6.2012; fotografata). Da osservare la sua futura evoluzione nella regione.

#### SEGNALAZIONI FLORISTICHE VALDOSTANE: 367-370.

M. BOVIO, Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d'Aosta, 11020 Saint-Pierre (AO)

#### 367. *Rosa multiflora* Thunb. (Rosaceae)

Specie nuova per la Valle d'Aosta (neofita casuale).

REPERTO. Tra Saint-Nicolas e Charbonnière, scarpata artificiale di contenimento lungo la strada subito dopo il ponte sul torrente Gaboé, sicuramente introdotta con semina, altitudine 1272 m, 1 luglio 2010, M. Bovio, G. Trompetto, E. Lattanzi conferma det. (AO-N.SFV-2643).

OSSERVAZIONI. Specie Est-Asiatica, introdotta per scopo ornamentale, in Italia viene indicata come inselvatichita da Conti *et al.* (*Checklist Ital. Vasc. Flora*, 154: 2005) solo in alcune regioni, soprattutto al settentrione, mentre per le Alpi Aeschmann *et al.* (*Flora Alpina*, 1: 734, 2004) la segnalano solo per le provincie di Trento, Verona e per la regione di Salisburgo. Presso gli erbari di TO-HP (Bovio, feb. 2012) e FI (Cecchi *in litt.*, lug. 2012) non sono stati riscontrati reperti relativi alla Valle d'Aosta, così come non sono state trovate segnalazioni nella bibliografia floristica valdostana fondamentale. Nel sito qui indicato è giunta sicuramente attraverso l'operazione di semina della scarpata stradale. Da osservare la sua futura evoluzione in zona anche se non sembra specie dotata di grandi capacità di espansione.

#### 368. *Bromopsis benekenii* (Lange) Holub (Poaceae) (= *Bromus benekenii* [Lange] Trimen)

Conferma della presenza in Valle d'Aosta.

REPERTO. Morgex sull'altopiano di Molliex, bosco chiaro, altitudine 1390 m, 18 agosto 2011, M. Bovio, L. Bongiorno, M. Broglio e G. Trompetto, E. Banfi conferma det. (AO-N.SFV-2701).

OSSERVAZIONI. Specie Paleotemperata, secondo Conti *et al.* (*Checklist Ital. Vasc. Flora*, 63: 2005) in Italia diffusa soprattutto al nord e, seguendo Aeschmann *et al.* (*Flora Alpina*, 2: 916, 2004), presente in quasi tutte le Alpi. Popola boschi, radure, boscaglie in ambienti piuttosto aridi nei piani inferiori della vegetazione.

Per la Valle d'Aosta erano noti solo due dati relativi a due campioni all'erbario di Vaccari in FI censiti da Peyronel *et al.* (*Cat. pl. réc. Prof. Vac. Val. Aos.*, 105, 1988) e verificati di recente (Poggio, feb. 2002), raccolti nel 1902 rispettivamente "tra Ollomont e Valpelline (1000-1400 m)" e "sopra Ollomont, 1500 m". In TO-HP non sono vi sono invece materiali relativi alla Valle d'Aosta (Bovio, feb. 2012). Nella stazione qui segnalata la pianta è abbondante nel sottobosco sia come numero di individui sia come estensione.

#### 369. *Asparagus acutifolius* L. (Asparagaceae)

Conferma di stazione storica e della presenza in Valle d'Aosta.