

Distribuzione di *Artemisia chamaemelifolia* Vill. sulle Alpi

SIMONETTA PECCENINI

Istituto Botanico «Hanbury», Corso Dogali 1/C,
I - 16136 GENOVA, Italia

RIASSUNTO

Viene precisata la distribuzione di *Artemisia chamaemelifolia* Vill., specie xerofila, limitata sulle Alpi al settore sud-occidentale. Vengono fornite località nuove e una carta di distribuzione.

RÉSUMÉ

On a précisé la distribution de *Artemisia chamaemelifolia* Vill., espèce xerophile, limitée sur les Alpes au secteur sud-occidental. On fournit des nouvelles localités et une carte de distribution.

L'areale di *Artemisia chamaemelifolia* Vill. si estende dai Pirenei all'Iran. In Europa si rinviene sulle Alpi sud-occidentali, sui Pirenei, sulla Cordigliera Cantabrica e nel NW della Bulgaria (TUTIN *et al.*, 1976). Nel settore sud-occidentale delle Alpi la sua distribuzione è poco conosciuta nel dettaglio; gli autori di flore italiane riportano infatti dati distributivi incompleti.

È nota la presenza della specie nelle Hautes Alpes, presso Gap e Briançon, nelle Alpes Maritimes, presso St. Dalmas le Sauvage, e in Valle d'Aosta presso Cogne; PIGNATTI (1982) segnala la specie per la Valle d'Aosta anche di Dondena nella Valle di Champorcher, ma non vi sono conferme della sua presenza (Bovio, *com. verb.*); in Piemonte la specie è segnalata solo di Fenestrelle (FIORI, 1927), dato non riportato da PIGNATTI (1982), che limita la presenza in Italia di *Artemisia chamaemelifolia* alla sola Valle d'Aosta.

Invece *A. chamaemelifolia* è presente in Piemonte, oltre che a Fenestrelle, sia in Val Varaita, dove colonizza i pendii aridi più assolati di entrambi i versanti orografici, sia presso Garesio sopra a Trappa. La località della Val Varaita, benché documentata da numerosi campioni d'erbario, non è citata dalle flore, mentre la località di Garesio, citata come «Garbo della Luna» da COLLA (1834), venne in seguito tralasciata dagli autori; la specie non veniva infatti raccolta da più di un secolo. Il toponimo, non riportato nella tavoletta I.G.M. 91.IV.SO, corrisponde alla grotta n. 136 del Carasto Speleologico Piemontese che si apre nel calcare della Costa di M. Berlino. Sugli aridi pendii sommitali del versante S della costa è frequente *Artemisia chamaemelifolia*.

Ricerche effettuate negli Erbari di Firenze, Genova e Torino e ricerche di campagna hanno permesso di disegnare una carta di distribuzione della specie sulle Alpi (Fig. 1).

Artemisia chamaemelifolia si trova sulle Alpi su pendii sassosi aridi delle valli a clima più continentale ad una quota compresa fra i 500 e i 2400 m s.l.m.. Si inserisce nella vegetazione definita «Trokenrasen» da BRAUN-BLANQUET (1961) e più precisamente nello *Stipeto-Poion carniolicae* Br.-Bl. 1961.

ESEMPLARI D'ERBARIO CONTROLLATI

HAUTES ALPES – Bois Mondet près de Gap (H.tes Alpes), 9.1862, J. M. Borel, FI. – Gap, 1868, Grenier, FI. – Bois Gallet près Gap, 1906, Barla, FI. – Rabou, H.tes




Fig. 1 - Distribuzione di *Artemisia chamaemelifolia* Vill. sulle Alpi.

Alpes, forêt du Devèr, 1500 m, 1.10.1871, E. Burle, FI. – Rabou/Hautes Alpes, France, 10.1872, E. Burle, TO. – Rabou, H.tes Alpes, forêt du Devèr, 1500 m, 9 e 10.1871, E. Burle, TO. – H. Alpes: le Devèz de Rabou, près Gap., 17.7.1884, H. Gariod, TO. – Route du Lautaret au Monêtier (Dauphiné), 1800 m, 27.7.1907, Wilkzech, FI. – Bords de la route au Lauzet, Hautes Alpes, 1800 m, 7.8.1883, R. Noya, FI. – Route du Col du Lautaret au Moenestier de Briançon (Hautes Alpes), France, 13.9.1883, Rec. Ch. Ozanon, GE. – Lautaret (Hautes-Alpes): le long de la route près du Lauzet, 8.8.1874, Abbé P. Faure, TO.

ALPES MARITIMES – Col de Sanguiniere au dessus d'Estene, cours superieur du Var, 29.7.1877, L. Leresche, FI. – Du Col de Jalorgues à Saint Dalmas le Sauvage, 31.7.1877, Leresche, FI.

PIEMONTE – Alpi presso Ponte-Chianale, Valle di Varaita, 1845, Herb. Lisanum, TO. – Casteldelfino: rupi presso le grange Crosel sopra S. Anna di Bellino, 31.7.1925, P. Fontana, F. Nicola, TO. – Rupi erbose in Val Varaita, 29.7.1968, Montacchini, Ariello, TO. – Vallone di S. Anna di Bellino (Val Varaita) pascoli, 28.9.1970, Montacchini, Ariello, TO. – Val Varaita (CN), Vallone di Fiutrusa sopra Pontechianale, m 1800, 25.8.1986, S. Peccenini, Erb. Peccenini. – Fenestrelle, FI. – Fenestrelle: pascoli lungo la strada presso l'Alpe Lau, 19.8.1937, Prof. G. Negri, O. Fontana, TO. – Inter Tendam et Niceam, supra Garrexium loco dicto M. Garbo della Luna, Erb. G. B. Romano, TO. – Trappa presso Garessio (CN), pendii aridi della Costa di M. Berlino, fra Case Bertolini e Grappiolo, m 1000 circa, 21.7.1990, S. Peccenini, Erb. Peccenini.

VALLE D'AOSTA – Alpi di Cogne detto la Susse, 7.1853, Erb. Lisanum, TO. – Valle di Cogne, Vallone dell'Urtier all'Alpe Tavirone, 8.1895, Santoglio, TO. – Lungo la via sotto Vieyas, presso la Bergeria Tavirone, presso la Cappella del Cret, 8.1895, Santi, TO. – Cogne (Aosta): lungo la via presso Vièves, id presso gli Alpi Tavirone e Cappella del Cret, 8.1895, TO. – Val di Cogne, Alpi Graie, 8.1895, Santi, TO. – Alpe de Brouillot, V. de Cogne, Piémont, 7.1902, F. O. Wolf, GE. – Praterie degli Alpi Gueula e Tavirone su Cogne, 8.1903, Erb. Vallino, TO. – Intorno all'Alpe Tavirone e qua e là nelle praterie di Gueula e Susse. Alto Vallone Urthier su Cogne, 3.8.1903, Erb. Vallino, TO. – Cogne: pascoli sotto e sopra le Bergerie Susse e Tavirone, m 2100 a 2356 circa, 3.8.1903, Ferrari, Vallino, Negri, TO. – Cogne, pascoli sotto la Berg. Susse e Tavirone, 2300 m, 3.8.1903, Ferraris, FI. – Alpe Taverona (Cogne), m 2380, 31.8.1955, B. Peyronel, Ariello, TO. – Cogne, Alpe Tavirone, 17.8.1951, FI. – Cogne, Lilla, 1600-1700 m, FI. – Cogne, Chavanis, 2000 m, FI. – Inveni Cogne ultra, Allis, TO.

BIBLIOGRAFIA

- BRAUN-BLANQUET J., 1961 - Die inneralpine Trockenvegetation. Stuttgart.
 COLLA L., 1834 - Herbarium pedemontanum. Torino. 3: 345-346.
 FIORI A., 1927 - Nuova flora analitica d'Italia. Firenze. 2: 636.
 PIGNATTI S., 1982 - Flora d'Italia. Bologna. 3: 104.
 TUTIN T. G. *et al.* (Edit.) - Flora Europaea. Cambridge. 4 : 183.